

HANDBOK 04

Kläckdagboken

Planera en omgång. Följ äggen. Förstå vad du faktiskt vet.



Från startdatum till egen erfarenhet.

En ifyllbar planeringsjournal för hönsägg, med tydliga räkneexempel, observationsblad och uppföljning.

IFYLLBAR PDF / A4 / UTGÅVA 1.0

Räkna dagar på ett tydligt sätt

Ange både datum och klockslag för starten.

Hönsägg kläcks normalt efter ungefär 21 dygns ruvning. Det är ett riktvärde, inte ett löfte om en exakt tidpunkt. I den här dagboken är starten **dag 0**; dag 1 betyder att ett dygn har gått. [U2]

Datumexempel

Start: 1 april kl. 12.00.

Efter 1 dygn: 2 april kl. 12.00.

Efter 7 dygn: 8 april kl. 12.00.

Efter 21 dygn: 22 april kl. 12.00.

Startdatum + 21 kalenderdagar ger alltså den ungefärliga kläckdagen.

Startdatum

Starttid

Ungefärlig kläckdag, start + 21 dagar

Planerad uppföljning / kontakt

Koppla andra moment till anvisningarna för din metod. Om en annan kalender kallar startdagen för dag 1, jämför datumen och klockslagen - inte bara dagnumret. Blanda inte två olika sätt att räkna.

Räkna resultatet rätt

Ett tydligt nämnartal gör jämförelsen meningsfull.

Andel kläckta av alla inlagda ägg

Antal kläckta ÷ antal inlagda × 100.

Exempel: 8 kläckta av 12 inlagda ger $8 \div 12 \times 100 = 66,7 \%$. Alla 12 ingår i nämnaren, även ägg som senare togs ur omgången.

Den siffran säger hur omgången föll ut från start. Den säger inte hur stor andel som var befruktad och förklarar inte varför vissa ägg inte kläcktes. Om du räknar andel kläckta av en annan grupp måste den gruppen beskrivas tydligt.

Antal inlagda vid start

Antal kläckta

Andel kläckta av alla inlagda, % - räkna manuellt

Datum då resultatet summerades

Antal fortfarande under uppföljning

Osäkra uppgifter eller sådant som gör jämförelsen begränsad

Om antalet inlagda är 0 är procentsatsen inte beräkningsbar. Skriv "ej beräknat". Summera inte en pågående omgång som ett slutligt resultat.